

飼料価格高騰に係る対策について (肉用牛繁殖)

目指すのは

飼料ロスの低減
飼料効率の向上
生産性の向上

日常の管理において、
どこでどのように
飼料が無駄になっている
かを考え、意識して
取り組んでみましょう

① 自給飼料と購入飼料の品質保持と適正保管



ロール

鳥獣等による破損がないか、こまめに点検・修繕し、ロールを密着させないようにしたり、テグスを張るなどの鳥獣被害対策をしましょう

牧草調製時には、乾燥しすぎに注意し、乳酸菌の添加を行うなどカビの発生防止を行いましょう

サイロ

詰め込み時はしっかり踏圧し、密度を高めましょう

開封後の取出口はこまめに密閉し、腐敗による廃棄量を減らしましょう



必要量のみ
取り出そう！



乾草

保管中に雨に濡れないように、保管状況を確認し、覆いをする等により対策をしましょう

土が混入しないように、パレットの上に置くなど直置きしないようにしましょう

飼料タンク

定期的に掃除を実施し、破損等がないかこまめに点検し、タンク内の飼料が良質な状態を保つように清掃・管理しましょう




② 食べ残しや無駄エサを減らし、餌の食い込みを増やそう



1日分の給与量を数回に分け、涼しい時間帯に給餌し、食べこぼしが減るようにしましょう



清潔で十分な水をいつでも飲めるようにしましょう



飼槽をこまめに掃除し、清潔に保ちましょう



細断により粗飼料の飼料効率をあげましょう

- ・ 配合飼料より先に粗飼料を給与しましょう
- ・ カビや土の混入した飼料は与えないようにしましょう
- ・ 給与メニューの切替えは2週間程度かけて徐々に行いましょう




整理整頓で無駄をなくそう！

③ 良質な自給飼料の確保による飼料費の低減



過剰施肥にならないよう、**土壌分析**の結果をもとに、適正な施肥を実施しましょう
また適期の除草や早めの防除に取り組む、天候をみながら計画的に作業を進めましょう

自給飼料生産の年間計画を立て、適正な時期に栽培することにより良質飼料を確保しましょう



※平年値は、1991年から2020年の30年間の観測値の平均をもとに算出しています。



飼養規模に適した作付計画と**適期収穫**により良質な自給飼料を生産しましょう

収穫・調製作業では土が混入しないようにしましょう

(参考) 栄養価の高い時期の飼料成分値

上段：原物中% 、下段：乾物中%


	形態	水分	粗蛋白質	T D N	特徴
トウモロコシ（黄熟期・西日本）	サイレージ	72.4	2.2 8.0	18.1 65.6	高栄養
ソルガム（ソルゴー型・開花～乳熟期）	サイレージ	75.8	1.7 7.0	13.0 53.7	2～3回収穫
スーダングラス	サイレージ	61.0	3.3 8.5	- -	2～3回収穫
イネ（飼料用品種・糊熟期）	サイレージ	63.6	2.3 6.4	19.4 53.2	水田の活用
イタリアンライグラス（1番草・出穂期）	サイレージ	67.1	4.1 12.5	22.0 66.9	水田裏作の活用

※日本標準飼料成分表（2009年版）より抜粋

④ 生産性向上に取り組もう

◎養分要求量

- ・分娩前後の増飼いにより母牛の繁殖障害を防止しましょう
- ・乾物量、タンパク質、エネルギー等を過不足なく調整するために飼料の成分分析・給与設計をしましょう



できるところから 取り組んでみましょう

問い合わせ先窓口

【 中部地区 】	中部農業改良普及センター	0 9 8 5 - 3 0 - 6 1 2 1
【 南那珂地区 】	南那珂農業改良普及センター	0 9 8 7 - 2 1 - 9 5 5 0
【 北諸県地区 】	北諸県農業改良普及センター	0 9 8 6 - 3 8 - 1 5 5 4
【 西諸県地区 】	西諸県農業改良普及センター	0 9 8 4 - 2 3 - 5 1 0 5
【 児湯地区 】	児湯農業改良普及センター	0 9 8 3 - 4 3 - 2 3 1 1
【 東臼杵地区 】	東臼杵南部農業改良普及センター	0 9 8 2 - 6 8 - 3 1 0 0
	東臼杵北部農業改良普及センター	0 9 8 2 - 3 2 - 3 2 1 6
【 西臼杵地区 】	西臼杵農業改良普及センター	0 9 8 2 - 7 2 - 2 1 5 8
【 県域 】	総合農業試験場専門技術センター	0 9 8 5 - 4 4 - 1 6 2 0
	宮崎県畜産振興課	0 9 8 5 - 2 6 - 7 1 3 8