

農場周辺の**高病原性鳥インフルエンザ**のウイルスが **非常に多くなっています！**

全国的に高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されています。
これまで以上に、本病の発生予防を徹底しましょう！

**家きん舎への人や、野生動物によるウイルスの侵入を防ぐことが
特に重要です！**

発生予防対策の特に重要なポイント

- 農場内や家きん舎周囲の**消毒は毎日**行いましょう！
- 家きん舎等への出入り時に**消毒の実施・長靴の交換が適切にできているか、動線が交差していないか、今一度、点検・確認**をお願いします！
- **長靴はしっかり汚れを落としてから消毒し、踏込消毒槽などの消毒薬は少なくとも毎日、汚れたらその都度、交換**しましょう！
- 農場内や家きん舎の周囲には**ウイルスが侵入する経路が多く存在**していますので、**今一度、点検・確認**をお願いします！

ため池等の水場を
意識し、その近く
は徹底して消毒！

衛生管理区域内の
野生動物対策



池
**農場内や家きん舎周囲
の消毒は毎日実施**

家きん舎入口の人・物対策



**専用長靴の設置
交差汚染防止**



**消毒薬は毎日
又は汚れたら
その都度交換**



**長靴は汚れを
落としてから消毒**

衛生管理区域入口の
人・車両・物対策



**専用の服・車両・手指・
長靴の使用 物品消毒の徹底**

家
き
ん
舎

家きん舎の野生動物対策



**集卵ベルト等の
開口部の隙間対策 鶏舎破損の補修**



◆ 飼養家きんの毎日の健康観察を念入りに行い、異状を見つけた場合は、直ちに最寄りの家畜保健衛生所に連絡してください。

農林水産省HPI「鳥インフルエンザに関する情報」→

