

各関係機関の長
各病害虫防除員 殿

宮崎県病害虫防除・肥料検査センター所長

令和3年度病害虫防除情報第8号



カンザワハダニについて、各地域の発生状況を把握しながら適切な防除指導をお願いします。

茶のカンザワハダニが多くなっています。適期防除に努めてください。

- 1 作物名 茶
- 2 病害虫名 カンザワハダニ

3 発生状況（経過）

11月中旬の巡回調査の結果、カンザワハダニの発生面積率は66.7%で平年（23.5%）に比べて多、寄生葉率は6.7%で平年（1.4%）に比べて多であった。先月から発生が多い状態が続いており注意が必要である。



4 防除上の注意

- (1) カンザワハダニの密度が高い茶園では、春先の発生量が多くなり、加害されると減収、品質低下が著しいため、2月頃までに薬剤散布を行う。
- (2) チャトゲコナジラミが多い茶園は、カンザワハダニとの同時防除が行えるよう、どちらの害虫にも効果のある薬剤を選定するのが望ましい。

5 その他

赤焼病が発生している茶園では、マシン油乳剤等が発生を助長するおそれがあるので注意する。

《連絡先》

宮崎県総合農業試験場 病害虫防除・肥料検査課
(病害虫防除・肥料検査センター) 榎本・久野
TEL : 0985-73-6670 Fax : 0985-73-2127
ホームページ : <http://www.jpnp.ne.jp/miyazaki>
E-mail : byogaichu-hiryo@pref.miyazaki.lg.jp