

各関係機関の長 殿
各病害虫防除員

宮崎県病害虫防除・肥料検査センター所長

令和7年度病害虫防除情報第5号

サトイモ疫病について、各地域の発生状況を把握しながら適切な防除指導をお願いします。

**県内のサトイモ栽培ほ場において疫病の発生が確認されました。
今後の発生に注意して適切な防除を行ってください。**

1 作物名 サトイモ

2 病害虫名 疫 病

3 発生状況（経過）

- (1) 8月第2半旬に、県内のサトイモほ場において、疫病の初発生が確認された。
- (2) 感染すると葉や葉柄に病斑が発生し（図1）、病斑が拡大すると、収量の低下につながる。
- (3) 例年7月から8月にかけて急速に蔓延する（図2）。特に今後、台風や降雨によって、発病が助長されるおそれがあり、発生の拡大に注意が必要である。



図1 感染した株の病斑（葉、葉柄）




図2 過去巡回調査における発病株率の推移

4 本病の特徴

本病の病原菌である *Phytophthora colocasiae* は27～30℃で最も良く増殖することから、夏期に曇雨天日が続くと急激に蔓延する。葉や葉柄上の病斑に形成した遊走子または遊走子のうが風雨により周囲へ飛散し、二次感染が起こる。

5 防除上の注意

- (1) 発病前からの定期的な薬剤散布が防除効果を向上させる。ほ場をこまめに巡回し、発病前はマンゼブ水和剤、シアゾファミド水和剤、銅水和剤および炭酸水素ナトリウム・銅水和剤による予防散布を実施する。発病後は治療効果のあるオキサチアピプロリン・マンジプロパミド水和剤、アミスルブロム・シモキサニル水和剤、ピカルブトラゾクス水和剤、アゾキシストロビン水和剤およびベンチアバリカルブイソプロピル・マンゼブ水和剤を散布する。

散布にあたっては、使用時期（収穫前日数）を必ず確認すること（表1参照）。

- (2) 薬剤散布に当たっては、必ず展着剤を加用し、株元まで十分量を散布する。また、高温時の薬剤散布により薬害を生じることが確認されているので、日中の気温が高い時間の散布はできるだけ避ける。
- (3) 同じ成分の殺菌剤を連用すると耐性菌が発生するリスクがあるため、異なる作用機作の殺菌剤をローテーション散布する。
- (4) 排水不良のほ場では発生が助長されるので、ほ場外への排水を促すため、排水用の溝を必ず設置する。
- (5) 防除体系などの詳細については、ひなたMAFINに掲載されている「サトイモ疫病対策マニュアル（2024年版）」を参照。
(https://hinatamafin.pref.miyazaki.lg.jp/soshiki/noshi_byogai/2287.html)

表1 サトイモ疫病に対する登録農薬（令和7年8月1日現在）

薬剤名	商品名	希釈倍数	散布液量	使用方法	使用回数	使用時期
マンゼブ水和剤※1	ペンコゼブ 水和剤	500倍	100-300 L/10a	散布	2回以内※	収穫7日前まで
	ジマンダイセン 水和剤					
	マンゼート 水和剤					
ベンチアバリカルブイソ プロピル・マンゼブ 水和剤※1	ベネセット 水和剤※2	1,000倍	100-300 L/10a	散布		収穫7日前まで
	カンパネラ 水和剤※2					
銅水和剤	ICボルドー 66D※2	100倍	100-300 L/10a	散布	—	発病前～発病初期
	フジドーL フロアブル	500倍			—	—
炭酸水素ナトリウム ・銅水和剤	ジーファイン 水和剤※2	1,000倍	150-500 L/10a	散布	—	収穫前日まで
シアゾファミド 水和剤	ランマン フロアブル※2	2,000倍	100-300 L/10a	散布	2回以内	収穫前日まで
オキサチアピプロリン・ マンジプロパミド水和剤	オロンディス ウルトラSC	2,000倍	100-300 L/10a	散布	2回以内	収穫7日前まで
アミスルブロム・ シモキサニル水和剤	ダイナモ 顆粒水和剤※2	2,000倍	100-300 L/10a	散布	3回以内	収穫21日前まで
ピカルブトラゾクス 水和剤	ピシロック フロアブル	1,000倍	100-300 L/10a	散布	3回以内	収穫前日まで
アゾキシストロビン 水和剤	アミスター20 フロアブル※2	2,000倍	100-300 L/10a	散布	3回以内	収穫14日前まで

※1 マンゼブを含む農薬の総使用回数（2回以内）に注意する。

※2 無人航空機による散布も登録されているおり、使用の際は登録内容を確認する。

6 その他

6月1日から8月31日までの3か月間、農薬危害防止運動を実施します。農薬散布にあたっては、ラベル表示の確認を十分に行い、農薬使用基準を遵守し、危害防止に努めましょう。

《連絡先》

宮崎県総合農業試験場病害虫防除・肥料検査課
（病害虫防除・肥料検査センター） 田爪、後藤
TEL：0985-73-6670 FAX：0985-73-2127
E-mail：byogaichu-hiryo@pref.miyazaki.lg.jp
HP：https://hinatamafin.pref.miyazaki.lg.jp/soshiki/noshi_byogai/index.html

